



令和2年度 神崎市 予防接種カレンダー



★接種の順番、接種間隔は、医師と相談しながら、スケジュールを立てましょう。
各予防接種の標準的な接種期間・間隔は、「予防接種と子どもの健康」※1をご参照ください。

R2.4.1 現在

定期の 予防接種	対象年齢	接種間隔
Hib(ヒブ) 感染症	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	1歳未満の間に27日以上あけて3回、更に7か月以上あけて1回接種 ※接種開始年齢により、接種回数が異なる
小児の肺炎球菌 感染症	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	2歳未満の間に27日以上あけて3回、更に60日以上あけて生後12か月以降1回接種 ※接種開始年齢により、接種回数が異なる
B型肝炎	1歳の誕生日の前日まで	27日以上あけて2回接種し、3回目は1回目から139日以上あけて1回接種
4種混合(DPT-IPV) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	生後3か月～7歳6か月の前日まで	20日以上あけて3回、更に6か月以上あけて1回接種
BCG	1歳の誕生日の前日まで	1回接種
麻しん風しん混合(MR)	1期：1歳～2歳の誕生日の前日まで	1回接種
	2期：就学前1年間(年長相当)の児(H26.4.2～H27.4.1生まれ)	1回接種 ※実施期間：R2.4.1～R3.3.31
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳の誕生日の前日まで	3か月以上あけて2回接種 ※水痘(水ぼうそう)にかかったことのある方は対象外
日本脳炎	1期：生後6か月～7歳6か月の前日まで	6日以上あけて2回、更に6か月以上あけて1回接種
	2期：9～13歳の誕生日の前日まで	1回接種
	特例：H19.4.2～H21.10.1生まれ	1期(計3回)のうち、未接種分を13歳未満までに接種
	特例：H12.4.2～H19.4.1生まれ	1期・2期(計4回)のうち、未接種分を20歳未満までに接種
2種混合(DT) (ジフテリア・破傷風)	11～13歳の誕生日の前日まで	1回接種
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	小学6年生から高校1年生相当の女子	2価：中学1年生の間に、1か月以上の間隔をおいて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回 4価：中学1年生の間に、1か月以上の間隔をおいて2回、2回目から3か月以上あけて1回 ※H25.6月より副反応等の検討のため積極的勧奨を控えている

★予防接種の受け方

- ・佐賀県内の実施医療機関にて接種ができます。直接かかりつけ医療機関にお申し込みください。定期接種の対象者は無料です。

★持っていくもの

- ・母子健康手帳
- ・予診票(医療機関窓口にある場合もあります)

★留意点

- ・原則保護者が同伴してください。祖父母等が同伴する場合は「委任状」が必要です。
- ・予防接種を受ける前に「予防接種と子どもの健康」※1を読みましょう。
- ・特別な理由で県外での接種を希望される方は、下記までご連絡ください。

※1「予防接種と子どもの健康」は、出生時に予診票と併せてお渡ししています。

諸事情により必要な方は、下記までご連絡ください。
また、予防接種法の改正等により、今後、内容について変更が生じる場合があります。
市報「かんざき」や神崎市ホームページ等もよくご覧ください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。

☆異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔☆

生ワクチン(接種後は4週間以上あける)

BCG・麻しん風しん混合(MR)・水痘

不活化ワクチン(接種後は1週間以上あける)

Hib(ヒブ)感染症・小児の肺炎球菌感染症・B型肝炎・4種混合・日本脳炎・2種混合・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)



☆問い合わせ先☆ 神崎市 健康増進課 母子保健係(神崎町保健センター) ☎51-1234