



令和3年度 神崎市 予防接種カレンダー



★接種の順番、接種間隔は、医師と相談しながら、スケジュールを立てましょう。
各予防接種の標準的な接種期間・間隔は、「予防接種と子どもの健康」※1をご参照ください。

定期の 予防接種	対象年齢	接種間隔
ロタウイルス	1 価：生後 6 週～24 週まで	1 価：2 回接種（27 日以上の間隔をあける） ※初回接種は、出生 14 週 6 日までに接種
	5 価：生後 6 週～32 週まで	5 価：3 回接種（27 日以上の間隔をあける） ※初回接種は、出生 14 週 6 日までに接種
B 型肝炎	1 歳の誕生日の前日まで	27 日以上あけて 2 回接種し、3 回目は 1 回目から 139 日以上あけて 1 回接種
Hib(ヒブ) 感染症	生後 2 か月～5 歳の誕生日の前日まで	1 歳未満の間に 27 日以上あけて 3 回、更に 7 か月以上あけて 1 回接種 ※接種開始年齢により、接種回数が異なる
小児の肺炎球菌 感染症	生後 2 か月～5 歳の誕生日の前日まで	2 歳未満の間に 27 日以上あけて 3 回、更に 60 日以上あけて 生後 12 か月以降 1 回接種 ※接種開始年齢により、接種回数が異なる
4 種混合 (DPT-IPV) (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ)	生後 3 か月～7 歳 6 か月の前日まで	20 日以上あけて 3 回、更に 6 か月以上あけて 1 回接種
BCG	1 歳の誕生日の前日まで	1 回接種
麻しん風しん混合 (MR)	1 期：1 歳～2 歳の誕生日の前日まで	1 回接種
	2 期：就学前 1 年間(年長相当)の児 (H27.4.2～H28.4.1 生まれ)	1 回接種 ※実施期間：R3.4.1～R4.3.31
水痘 (水ぼうそう)	1 歳～3 歳の誕生日の前日まで	3 か月以上あけて 2 回接種 ※水痘(水ぼうそう)にかかったことのある方は対象外
日本脳炎	1 期：生後 6 か月～7 歳 6 か月の前日まで	6 日以上あけて 2 回、更に 6 か月以上あけて 1 回接種
	2 期：9～13 歳の誕生日の前日まで	1 回接種
	特例：H20.4.2～H21.10.1 生まれ	1 期(計 3 回)のうち、未接種分を 13 歳未満までに接種
	特例：H13.4.2～H19.4.1 生まれ	1 期・2 期(計 4 回)のうち、未接種分を 20 歳未満までに接種
2 種混合 (DT) (ジフテリア・破傷風)	11～13 歳の誕生日の前日まで	1 回接種
ヒトパピローマ ウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	小学 6 年生から高校 1 年生相当の女子	2 価：1 か月以上あけて 2 回接種し、1 回目から 5 か月以上 かつ 2 回目から 2 か月半以上あけて 1 回接種 4 価：1 か月以上あけて 2 回接種し、2 回目から 3 か月以上 あけて 1 回接種

★予防接種の受け方

- ・佐賀県内の実施医療機関にて接種ができます。
直接かかりつけ医療機関にお申し込みください。
定期接種の対象者は無料です。

★持っていくもの

- ・母子健康手帳
- ・予診票（医療機関窓口にある場合もあります）

★留意点

- ・原則保護者が同伴してください。祖父母等が同伴する場合は「委任状」が必要です。
- ・予防接種を受ける前に「予防接種と子どもの健康」※1 を読みましょう。
- ・特別な理由で県外での接種を希望される方は、下記までご連絡ください。

※1 「予防接種と子どもの健康」は、出生時に予診票と併せてお渡ししています。

諸事情により必要な方は、下記までご連絡ください。
また、予防接種法の改正等により、今後、内容について変更が生じる場合があります。
市報「かんざき」や神崎市ホームページ等もよくご覧ください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。

☆ワクチンの接種間隔について☆
生ワクチンから別の生ワクチンを接種する
場合には、27 日以上の間隔をあけること
が必要です。

生ワクチン

BCG・麻しん風しん混合(MR)・水痘



☆問い合わせ先☆ 神崎市 健康増進課 母子保健係

☎51-1234